希学園 第401回 小6公開テスト 解説動画

下記、URLよりご視聴いただけます。

動画タイトル	URL
第401回公開テスト 小6算数 解説動画(2025年10月12日実施)	https://vimeo.com/1126138324/94520b836a

(1)	2.5	(2)	$\frac{1}{210}$	(3)	528	(4)	96900
						,	
2 (1)	9.6	(%) (2)	24	(本) (3)	70	(4)	18 (通り)
(1)	81	(cm²) (2)	108	(cm) (3)	8:3	(4)	690 (cm²)
(1)	9 12	(2)	$9\frac{7}{12}$	(3)	7 1 番	目 (4)	109 番目
<u> </u>		•		- ,		•	
(1) 每分	80	m (2) 每分	110	m (3)	7 [₱] 58	分	
		• 1				_	
(1)	62	cm (2)	240	cm³			
		1					
7 (1)	93	(2)	1354				

14 % 15 %

(配点)

8 (1)

各 4 点 × 25 图(2); 完答


19

希学園 第401回 公開テスト 小6 算数 2025年10月12日実施 解説 (2-1)


- 1 (3) $(6.5 \times 6.5 40) \times 528 \div (3.5 \times 3.5 10) = 2.25 \times 528 \div 2.25 = 528$
 - (4) $\underline{347} \times 732 969 \times 247 + 237 \times \underline{347} = 347 \times \underline{(732 + 237)} \underline{969} \times 247$ = $969 \times (347 - 247) = 96900$
- 2 (1) $200 \times 0.12 + 300 \times 0.08 = 48$ (g) … さとう $48 \div 500 = 0.096 \rightarrow 9.6\%$
 - (2) 上下の正八角形で、 $8 \times 2 = 16$ (本)と、上下の面をつなぐ 辺が8本。合わせて、16 + 8 = 24(本)




- (3) $12600 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7$ また、3つの数がなるべく近い方が合計が小さくなる。 $20 \times 20 \times 20 = 8000$ から考えて、およそ $20 \sim 30$ の3つの数の積と考えられる。 $5 \times 5 = 25$ 、 $3 \times 7 = 21$ 、 $2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$ のとき。 よって、25 + 21 + 24 = 70
- (4) ボールの個数の組み合わせは、(3)、(2,1)、(1,1,1)のどれか。 (3)は、赤 3 個か青 3 個の 2 通り。(2,1)は、 $4 \times 3 = 12$ (通り)、 (1,1,1)は $_4$ C₃=4 通り。よって、全部で、 $_2+12+4=18$ (通り)
- 3 (1) 右の図のように、半円の中心を考える。 $10 \div 2 = 5 \text{ (cm)} \cdots$ 半径 $8 \div 2 = 4 \text{ (cm)}$ $4 + 5 = 9 \text{ (cm)} \cdots$ 正方形の1辺 $9 \times 9 = 81 \text{ (cm)}$



- (2) 直線L上に頂点が2個ある。20-2=18(個), $18\div 2=9$ より, 正方形は9個。よって、9cmまで。 まわりの長さは、長方形に直して考えることができる。 たては9cm, 横は、 $(1+9)\times 9\div 2=45$ (cm) よって、 $(9+45)\times 2=108$ (cm)
- (3) 正三角形を回転させて,正六角形の辺にくっつける。 さらに内部を小正三角形に区切るとよい。 右の図から,面積比は,24:9=8:3




(4) 6:6=1:1,6:8=3:4, 網目部分の相似などを使って,各部分の長さを求める。 体積が小さいものは切り口より奥の立体で, 12+3=15(cm),12+8=20(cm)より, 15×15÷2×20× $\frac{1}{3}$ =750(cm)の三角すいから, 3×3÷2×4× $\frac{1}{3}$ =6(cm)の三角すいを除く。 750-(6×2+48)=690(cm)




- 4 (1) $\frac{1}{2}$, $/\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $/\frac{1}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{5}{6}$, $/\frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{8}$, $/\frac{1}{10}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{5}{10}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{9}{10}$, $/\frac{1}{12}$, $\frac{3}{12}$, ... 分子が奇数, 分母が2, 4, 6, …となる分数の列。 20 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 より, 6 セット目の5番目。 1, 3, 5, 7, 9で分子は9, 分母は, $2 \times 6 = 12$ なので, $\frac{9}{12}$ 。
 - (2) $\frac{1}{2}$ =0.5, $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{4}$ =1, $\frac{1}{6}$ + $\frac{3}{6}$ + $\frac{5}{6}$ =1.5, $\frac{1}{8}$ + $\frac{3}{8}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{7}{8}$ =2, …のように, それぞれのセットの合計は等差数列になる。 0.5+1+1.5+2+2.5+ $\frac{1}{12}$ + $\frac{3}{12}$ + $\frac{5}{12}$ + $\frac{7}{12}$ + $\frac{9}{12}$ =9 $\frac{7}{12}$
 - (3) 分子の 9 より、セット内の 5 番目、分母の24 より、12セット目。 $(1+11)\times 11\div 2+5=71$ (番目)
 - (4) $0.5+1+1.5+\cdots$ を、53に近づける。 これは、 $1+2+3+\cdots$ の半分なので、これが106に近づくときを考える。 $1+2+\cdots+13=91$ 、 $1+2+\cdots+14=105$ よって、 $0.5+1+\cdots+7$ となる14セットまでの合計が、105の半分で52.5。 53-52.5=0.5 15セット目の $\frac{1}{30}$ 、 $\frac{3}{30}$ 、 $\frac{5}{30}$ の4個で、0.5をこえる。 よって、 $(1+14)\times14\div2+4=109$ (番月)

希学園 第401回 公開テスト 小6 算数 2025年10月12日実施 解説 (2-2)

5 (1) グラフのきょりの関係から、かずやはあつきより速く、かずやが学校に着いたのは8時17分から20分までに、あつきは240m進む。240÷(20-17)=80(m/分)。



- (2) 8時9分から17分までで、かずやはあつきより240m多く進む。 $240 \div (17-9) = 30 \text{ (m/分)} \rightarrow 80 + 30 = 110 \text{ (m/分)}$
- (3) 8時4分から9分までに進んだきょりの差は、 $30 \times (9-4) = 150 \text{ (m)}$ 8時4分に、あつきはかずやの家より150 m先まで進んでいる。 それまでに、 $(330+150) \div 80 = 6 \text{ (分)}$ 進んでいるので、 あつきが家を出発したのは、8時4分-6分=7時58分
- 6 (1) $22-(3+5)\times 2=6$ (cm) $(22-8-3\times 2)\div 2=4$ (cm) より, 各部分の長さは右の図の通り(単位; cm)。 よって、 \star の面積は, $(5+3)\times (4+3)+3\times 4\div 2=62$ (cm)




- (2) 五角形を底面とする高さが8 cmの五角柱になる。 五角形の面積は、 $6 \times 3 + 6 \times 4 \div 2 = 30$ (cm²) よって、 $30 \times 8 = 240$ (cm²)
- 7 (1) 3けたの数は、2けたの数と1275の平均。 よって、(2けたの数+1275)÷2=3けたの数 なので、 2けたの数は奇数で、3けたの数の百の位は6。 残る数は3、4、8、9なので、2けたの数の一の位は3か9。 9のとき、3けたの数の一の位にあてはまる数がない。 よって、2けたの数の一の位は3で、□3、6□□、1275となる。 残る数は4、8、9で、 □が4のとき、93、684、1275は公差が591の等差数列。

□が9のとき、十の位にうまく4、8が入らない。

- (2) 2けたの数の98はかなり大きい。よって、百の位にくり上がりが必ず起こる。 3けたの数が5□□のとき、4けたの数がない。 3けたの数が6□□のとき、4けたの数でありうるものは12□□。 このとき、百の位以上が等差数列なので、十の位以下も等差数列になる。 残る数は3、4、5、7で、98と等差数列になる2数を作ることができない。 3けたの数が7□□のとき、4けたの数でありうるものは13□□か14□□。 13□□のとき、百の位以上が等差数列ではない。 残る数は2、4、5、6で、98、7AB、13CDとすると、98、100+AB、100+CDの3つの数が等差数列。 A=2から順に調べると、98、126、154があり、98、726、1354は公差が628の等差数列。
- 8 (1) 6/9=5/40 40-7=33(日後) 33÷7=4(週間)あまり5(日後) 日直の回数を図にすると、右の図。 5/7(水)の日直を1回目とすると、6/9(月)の日直は24回目で、23回、つまり46人進む。 12+46=58(番)の人にあたるのが、1番。 よって、クラスの人数は、58-1=57の約数だが、13番の人がいるので、13人以上。 30人以下では19人のみ。

水才	全土	日月	火
\bigcirc	2)(3)	4	(5)
607	7)(8)	9	\bigcirc
11	2(13)	14	\bigcirc
(16)(1)	7)(18)	19	20
21)2	2)(23)	24	

(2) 7/1=6/31=5/62,62-7=55(日後) 55÷7=7(週間)あまり6(日後) 水曜日の6日後は火曜日で, 5+5×7=40(回目)の日直。 39回,つまり78人進む。 12+78=90(番)から2人。



90÷19=4(周)あまり14(番) → 出席番号が14番と15番の2人。

(配点)各4点×25, 图(2); 完答